

## Soorten

Van de volgende citrussoorten wordt door de kwekerij te Tamansarie plantmateriaal aangemaakt en verkocht:

1. Sinaasappel (Kwatta 202, Alidjan, Valencia);
2. Tangelo;
3. Gele King / Pong Pong;
4. Rode King;
5. Curaçaose oranje / Manderijn;
6. Grapefruit;
7. Pompelmoes;
8. Lemmetje (Surinaams en Braziliaans);
9. Citroen.



*Manderijn*

## Planttijd

De beste planttijd is vlak voor de regenperiode.

## Terrein

Citrus moet je planten op hooggelegen zand-, leem- of kleigrond, met goede ontwateringsmogelijkheden. De trefen tussen de bedden moeten schuin afgestoken worden om afkalving van de kanten te beperken.



*Grapefruit*

## Plantverband

Afhankelijk van de bedbreedte, grondsoort en de citrussoort die je wilt, kunnen per hectare ongeveer 250 tot 300 bomen worden gepland. Bij een even bedbreedte van 6 - 8 m, 1 rij bomen per bed.

## Plantgat

Even oppervlakte van ca. 1 m<sup>2</sup> ompsitten en daarna een even plantgat maken van 30 tot 40 cm. diep.



*Lemmetje*

## Uitplanten

De citrusplantjes moeten, indien mogelijk, direct na aankomst worden uitgeplant. Als dit niet mogelijk is, moet je de plantjes in de schaduw zetten en zorgen voor voldoende water. Vóór het uitplanten moet je de grond in de plantzakjes goed natmaken. Scheur de zakjes daarna heel voorzichtig open. Zorg ervoor dat je de wortels niet beschadigt. Vervolgens zet je de plant met de gehele kluit in het plantgat. De bovenste wortel moet op zijn minst op gelijke hoogte met de grond komen, waarna je deze aanaardt.

## Bodembedekker

Kudzu is de meest geschikte bodembedekker. Het houdt de grond koel, voorziet de grond van stikstof, onderdrukt onkruid en beschermt de bodem tegen uitspoeling. Per hectare zijn ca. 100 gewortelde kudzu stekken nodig die in de regentijd, liefst voordat er citrus wordt geplant, op het veld worden uitgezet.

## Onderhoud

De boomspiegel moet worden schoongehouden door deze te wieden met houwens of met herbiciden (gramoxone: 4 cc per liter water opgelost) te bespuiten. Verwijder de eventuele uitlopers van de onderstam. Let er verder op dat de stam van de citrusbomen niet wordt beschadigd. Dit vergroot namelijk de kans op ziekten.

## Bemesting

Met NPK, die sporenelementen bevat (blauwkorrel 12 - 12 - 17 - 2) en ureum. Per plant wordt 200 gram NPK en 45 gram ureum gegeven. Op zandgronden is het belangrijk sporenelementen toe te voegen. Per jaar wordt er twee keren bemest.



Ministerie van Landbouw,  
Veeteelt en Visserij

Onderdirectoraat Landbouw

*Afdeling Agrarische  
Voorlichting i.o.  
Letitia Vriesdelaan no.8  
Tel. No. 479112 # 1410  
Website: [lvv.gov.sr](http://lvv.gov.sr)*

CITRUS TELEN  
CITRUS TELEN

